

食道がん

ID	レジム名	一般名(略号)	用量	用法	1コース			
S501	FP+Rt療法 (食道癌)	フルオロウラシル(5-FU)	700~1000	mg/m ²	持続点滴静注	day1~5	28	日
		シスプラチン(CDDP)	70~75	mg/m ²	点滴静注	day1		
		Rt(放射線)	1.8	Gy/day		day1~5・8~12・15~19・ 22~26・29~33・36~38		
S502	FP療法 (食道癌)	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/m ²	持続点滴静注	day1~5	28	日
		シスプラチン(CDDP)	80	mg/m ²	点滴静注	day1		
S503	術前FP療法 (食道癌)	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/m ²	持続点滴静注	day1~5	21	日
		シスプラチン(CDDP)	80	mg/m ²	点滴静注	day1		
S504	triweekly DTX療法 (食道癌)	トセタキセル(DTX)	70	mg/m ²	点滴静注	day1	21~ 28	日
S505	S-1療法 (食道癌)	テカフル・キメラシル・オテラシル(TS-1)	80	mg/m ²	経口	day1~28	42	日
S506	weekly PTX療法 (食道癌)	パクリタキセル(PTX)	100	mg/m ²	点滴静注	day1・8・15・22・29・36	49	日
S507	ニボルマブ療法 (食道癌)	ニボルマブ(NIV)	240	mg/body	点滴静注	day1	14	日