

婦人科癌

ID	レジメン名	一般名(略号)	用量	用法		1コース
G001	TC療法 (卵巣癌)	パクリタキセル(PTX)	175 mg/m ²	点滴静注	day1	21 日
		カルボプラチン(CBDCA)	5 AUC	点滴静注	day1	
G002	DC療法 (卵巣癌)	ドセタキセル(DTX)	60 mg/m ²	点滴静注	day1	21 日
		カルボプラチン(CBDCA)	5 AUC	点滴静注	day1	
G005	weekly PTX療法 (卵巣癌)	パクリタキセル(PTX)	80 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28 日
G007	CPT-11単独療法 (卵巣癌)	イリノテカン(CPT-11)	100 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28 日
G008	Doxil療法 (卵巣癌)	リボソマルトキシルピシシ(PLD)	50 mg/m ²	点滴静注	day1	28 日
G009	GEM療法±Bev (卵巣癌)	ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28 日
		ベハシスマブ(BEV)	15 mg/kg	点滴静注	day1	
G010	weeklyPTX+Bev療法 (卵巣癌)	パクリタキセル(PTX)	80 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15・22	28 日
		ベハシスマブ(BEV)	15 mg/kg	点滴静注	day1	
G012	PLD+Bev療法 (卵巣癌)	リボソマルトキシルピシシ(PLD)	40 mg/m ²	点滴静注	day1	28 日
		ベハシスマブ(BEV)	15 mg/kg	点滴静注	day1	21 日
G013	ハイカムチン療法	ノキテカン	1.5 mg/m ²	点滴静注	day1	21 日
G014	CBDCA+PLD療法 (卵巣癌)	リボソマルトキシルピシシ(PLD)	30 mg/m ²	点滴静注	day1	28 日
		カルボプラチン(CBDCA)	5 AUC	点滴静注	day1	
G107	DTX療法 (子宮体癌)	ドセタキセル(DTX)	70 mg/m ²	点滴静注	day1	21 日
G108	LP療法 (子宮体癌)	ペンブロリスマブ	200 mg/body	点滴静注	day1(21日ノケール)	21/42 日
		ペンブロリスマブ	400 mg/body	点滴静注	day1(42日ノケール)	
		レンパチニブ	20 mg/body	内服	Day1~21	
G109	Pem+TC療法 (子宮体癌)	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	day1	21 日
		パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	day1	
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	day1	
G205	TP療法 (子宮頸癌)	パクリタキセル(PTX)	175 mg/m ²	点滴静注	day1	21 日
		シスプラチン(CDDP)	75 mg/m ²	点滴静注	day1	
G206	TC±Bev±Pem療法 (子宮頸癌)	パクリタキセル(PTX)	175 mg/m ²	点滴静注	day1	21 日
		カルボプラチン(CBDCA)	5 AUC	点滴静注	day1	
		ペンブロリスマブ	200 mg/body	点滴静注	day1	
		ベハシスマブ(BEV)	15 mg/kg	点滴静注	day1	
G207	Radiation併用Cis +Pem療法 (子宮頸癌)	シスプラチン(CDDP)	40 mg/m ²	点滴静注	day1, 8, 15, 22, 29	484 日
		ペンブロリスマブ	200 mg/body	点滴静注	day1(21日ケールで5回)	
		ペンブロリスマブ	400 mg/body	点滴静注	day106(42日ケールで9回)	

婦人科癌

ID	レジメン名	一般名(略号)	用量	用法		1コース
		Rt(放射線)	2 Gy/day		別途規定	
G601	ddTC療法 (卵巣・卵管・腹膜癌)	パクリタキセル(PTX)	80 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	21 日
		カルボプラチン(CBDCA)	6 AUC	点滴静注	day1	
G602	GC±Bev療法 (卵巣・卵管・腹膜癌)	ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8	21 日
		カルボプラチン(CBDCA)	4 AUC	点滴静注	day1	
		ベハシスマブ(BEV)	15 mg/kg	点滴静注	day1	
G603	ノギテカン療法 (卵巣・卵管・腹膜癌)	ノギテカン	1.25 mg/m ²	点滴静注	day1~5	21 日
		ベハシスマブ(BEV)	15 mg/kg	点滴静注	day1	
G701	eriburin療法 (軟部肉腫)	エリフリン	1.4 mg/m ²	点滴静注	day1・8	21 日
G702	トラベクテジン療法 (軟部肉腫)	トラベクテジン	1.2 mg/m ²	点滴静注	day1	21 日