

大腸がん

ID	レジメン名	一般名(略号)	用量	用法		1コース
S104	mFOLFOX6±Bev療法 (大腸癌)	ペバシスマブ(BEV)	5 mg/kg	点滴静注	day1	14 日
		レボホリナート(I-LV)	200 mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン(L-OHP)	85 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	400 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	2400 mg/m ²	持続点滴静注	day1	
S106	FOLFIRI±Bev療法 (大腸癌)	ペバシスマブ(BEV)	5 mg/kg	点滴静注	day1	14 日
		レボホリナート(I-LV)	200 mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリリテカン(CPT-11)	150 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	400 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	2400 mg/m ²	持続点滴静注	day1	
S108	XELOX±BEV療法 (大腸癌)	ペバシスマブ(BEV)	7.5 mg/kg	点滴静注	day1	21 日
		カペシタビン	2000 mg/m ²	経口	day1~14	
		オキサリプラチン(L-OHP)	130 mg/m ²	点滴静注	day1	
S110	CPT-11療法 (大腸癌)	イリリテカン(CPT-11)	150 mg/m ²	点滴静注	day1	14 日
S111	3week IRIS療法 (大腸癌)	イリリテカン(CPT-11)	150 mg/m ²	点滴静注	day1	21 日
		テガフル・キメラシル・オテラシル(TS-1)	80 mg/m ²	経口	day1~14	
S112	4week IRIS±BEV療法 (S-1 2投2休)(大腸癌)	ペバシスマブ(BEV)	5 mg/kg	点滴静注	day1・15	28 日
		イリリテカン(CPT-11)	100 mg/m ²	点滴静注	day1・15	
		テガフル・キメラシル・オテラシル(TS-1)	80 mg/m ²	経口	day1~14	
S116	SOX±BEV療法 (大腸癌)	ペバシスマブ(BEV)	7.5 mg/kg	点滴静注	day1	21 日
		オキサリプラチン(L-OHP)	130 mg/m ²	点滴静注	day1	
		テガフル・キメラシル・オテラシル(TS-1)	80 mg/m ²	経口	day1~14	
S122	mFOLFOX6+P-mab療法 (大腸癌)	パニツムマブ(P-mab)	6 mg/kg	点滴静注	day1	14 日
		レボホリナート(I-LV)	200 mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン(L-OHP)	85 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	400 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	2400 mg/m ²	持続点滴静注	day1	
S123	FOLFIRI+P-mab療法 (大腸癌)	パニツムマブ(P-mab)	6 mg/kg	点滴静注	day1	14 日
		レボホリナート(I-LV)	200 mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリリテカン(CPT-11)	150 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	400 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	2400 mg/m ²	持続点滴静注	day1	

大腸がん

ID	レジメン名	一般名(略号)	用量	用法		1コース
S124	FOLFIRI+RAM療法 (大腸癌)	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1	14 日
		レボホリナート(I-LV)	200 mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリリテカン(CPT-11)	150 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル(5-FU)	400 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル(5-FU)	2400 mg/m ²	持続点滴静注	day1	
S125	TAS102+BEV療法 (大腸癌)	ヘパシスマブ(BEV)	5 mg/kg	点滴静注	day1、15	28 日
		トリフルリジン・チピラシル(TAS102)	70 mg/m ²	経口	day1~5、8~12	
S126	XELIRI±BEV療法 (大腸癌)	ヘパシスマブ(BEV)	7.5 mg/kg	点滴静注	day1	21 日
		カペンタシン	1600 mg/m ²	経口	day1~14	
		イリリテカン(CPT-11)	150~200 mg/m ²	点滴静注	day1	
S127	フェスゴ療法 (結腸・直腸癌)	フェスコ [®] IN	15 mL/body	皮下注	day1(1コース目)	21 日
		フェスコ [®] MA	10 mL/body	皮下注	day1(2コース目以降)	
S128	Nivo+Ipi療法 (食道癌)	ニボルマブ(NIV)	240 mg/body	点滴静注	day1	21/28(4クール目以降)
		イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	day1※IPIは4クール目まで、以降Nivo単独	