

肝・胆・膵がん

ID	レジメン名	一般名(略号)	用量	用法		1コース
S301	GEM療法 (胆道癌)	ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28 日
S303	GC療法 (胆道癌)	ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8	21 日
		シスプラチン(CDDP)	25 mg/m ²	点滴静注		
S304	GS療法 (胆道癌)	ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8	21 日
		テガフル・キメラシル・オテラシル(TS-1)	80~120 mg/body	経口	day1~14	
S305	GCD療法 (胆道癌)	ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8	21 日
		テュルハルマブ	1500 mg/回	点滴静注	day1(9コース目以降)	28 日
S402	GEM療法 (膵癌)	ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28 日
S403	GS療法 (膵癌)	ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8	21 日
		テガフル・キメラシル・オテラシル(TS-1)	80 mg/m ²	経口	day1~14	
S405	IrinogEM療法 (膵癌)	イリノテカン(CPT-11)	40 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	21 日
		ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	
S406	GEM+n-PTX療法 (膵癌)	ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28 日
		アルブミンナクシケセル(n-PTX)	125 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	
S407	FOLFIRINOX療法 (膵癌)	イリノテカン(CPT-11)	180 mg/kg	点滴静注	day1	14 日
		オキサリプラチン(L-OHP)	85 mg/m ²	点滴静注	day1	
		レホホリナート(I-LV)	200 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	400 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	2400 mg/m ²	持続点滴静注	day1	
S408	オニハイト [®] +5FU/LV療法 (膵癌)	レホホリナート(I-LV)	200 mg/m ²	点滴静注	day1	14 日
		イリノテカン塩酸塩水和物リホ [®] ソム製	150 mg/m ²	点滴静注	day1	
		フルオウラシル(5-FU)	2400 mg/m ²	持続点滴静注	day1~2	
S601	アテゾリズマブ +Bev療法 (肝細胞癌)	ベハ [®] シズマブ(BEV)	15 mg/kg	点滴静注	day1	21 日
		アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注	day1	